

CALCIO
MAGNESIO
VITAMINAS

Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene:

Vitamina B1 15,00 mg; Vitamina B2 15,00 mg; Vitamina B6 10,00 mg; Vitamina B12 0,01 mg; Vitamina C 500,00 mg; nicotinamida 50,00 mg; pantotenato cálcico 25,00 mg; biotina 0,15 mg; calcio (como carbonato) 100,00 mg; magnesio (como hidróxido) 100,00 mg

Excipientes: metilhidroxietilcelulosa 20,00 mg; povidona 26,45 mg; almidón pregelatinizado 33,50 mg; lactosa 12,125 mg; croscarmelosa sódica 67,00 mg; estearato de magnesio 20,50 mg; dióxido de silicio coloidal 9,00 mg; bióxido de titanio 3,90 mg; propilenglicol 0,63 mg; sacarina sódica 0,18 mg; talco 3,61 mg; hidroxipropilmetilcelulosa E-15 3,16 mg; polietilenglicol 6000 1,35 mg; amarillo ocaso laca aluminica 1,71 mg.

Acción Farmacológica y Terapéutica: reconstituyente general con acción estimulante del Sistema Nervioso Central.

A través del magnesio restablece la transmisión neuronal y el metabolismo muscular y a través del agregado de calcio y Vit. C tiene una acción antiinfecciosa, antitóxica y estimulante de las defensas.

Indicaciones: astenia psíquica y física – convalecencia – anorexia – sobreactividad psíquica y física.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a alguno de sus principios activos – hipercalcúria.

Efectos adversos: no posee a las dosis recomendadas.

Precauciones y advertencias:

Embarazo y lactancia: a las dosis recomendadas no hay evidencias de riesgo para el feto durante el embarazo, ni para el niño durante la lactancia.

Interferencia con métodos diagnósticos: la vitamina C puede alterar la determinación de la glucemia en diabetes, por lo que debe interrumpirse la toma de POLPER Calcio-Magnesio antes de la determinación. Durante la toma de POLPER Calcio-Magnesio la orina toma una coloración amarillenta por el contenido de Vit. B2 o riboflavina. Contiene fenilalanina.

Antagonismos y antidotismos: los principios activos de POLPER Calcio-Magnesio no tienen incompatibilidades, antagonismos ni antidotos.

Posología: uno a dos comprimidos por día.

Presentación: envases con 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: agosto de 2007

Forma de conservación

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.

- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.
MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.
Certificado N° 33.519
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Boyacá 237 - Buenos Aires

E-0319-04 / D0952 / Act.06/2012