

Fórmula: cada 100 gramos contiene: DICLOFENAC DIETILAMINA 1,160 g. Excipientes: Propilenglicol 3,070 g; Esencia de Lavanda 0,015 g; Alcohol etílico deshidratado 2,715 g; Clorodifluorometano 14,120 g; 1,1-Dicloro-1-Fluoroetano 78,920 g.

Acción Terapéutica: analgésico, antiinflamatorio de uso externo. **Indicaciones:** alivio sintomático del dolor y la inflamación localizada. • En procesos inflamatorios y dolorosos del aparato locomotor, como inflamación de tendones, músculos, articulaciones y ligamentos, provocados por torceduras o traumatismos. • Artrosis, lumbalgia, dolor de espalda, cuello y torticolis. • Esguinces y luxaciones. • Codo de tenista. **Posología y Modo de administración:** agitar antes de usar. Adultos y mayores de 12 años: presionar 3-6 segundos el atomizador sobre la zona afectada; puede efectuarse un leve masaje, hasta que se absorba totalmente: En caso necesario repetir la aplicación 3-4 veces al día. No aplicar sobre grandes superficies. **Contraindicaciones:** pacientes con o sin asma con antecedentes de ataques de asma, rinitis o urticaria por aspirina o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo. • Hipersensibilidad al diclofenac, ácido salicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos. • Hipersensibilidad a cualquier otro componente de la fórmula.

Reacciones adversas: ocasionalmente puede producirse dermatitis de contacto no alérgicas con signos y síntomas de ardor, picazón, enrojecimiento de la piel (eritema), hinchazón (edema) y erupción cutánea (rash), los que desaparecen al suspender la aplicación del medicamento. Si bien la absorción del diclofenac tópico es baja, la aplicación en grandes superficies o durante períodos prolongados puede desencadenar la aparición de efectos indeseables. **Advertencias:** no exceda la dosis recomendada. No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de usar este producto. Debe evitarse la exposición al sol por el riesgo de aparición de reacciones de fotosensibilidad. Si el dolor persiste por más de 14 días o empeora o si aparece enrojecimiento o irritación de la piel, interrumpa su aplicación y consulte a su médico.

Precauciones: Uso externo - Evite el contacto con ojos y mucosas. Aplicar sobre piel sana. No aplicar sobre la piel ampollada, heridas abiertas, úlceras, quemaduras o áreas de la piel que estén supurando.

Sobredosificación: en caso de ingestión accidental, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

Presentación: envases con 150 g / 125 ml.

Fecha de última revisión: Marzo de 2011.

Forma de conservación

- Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C. No exponer a más de 50°C.

- Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

- Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici - Farmacéutico.

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.

Certificado N° 47.648 - Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Boyacá 237 - Buenos Aires

La elaboración de los aerosoles se realiza en: Laboratorios CASASCO S.A.I.C. Av. Boyacá 237/41, Buenos Aires. El gasificado se realiza en Ruta Nacional N° 3 Km 44,720, Virrey del Pino, La Matanza, Pcia. Buenos Aires.



NO EXPONER A TEMPERATURA MAYOR DE 50° C. NO ARROJAR AL INCINERADOR O AL FUEGO. NO INFLAMABLE. NO PERFORAR. PROHIBIDO SU RELLENADO.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR

FREONES AUTORIZADOS - PROTOCOLO MONTREAL

BLOWDOWN
SPRAY

DICLOFENAC DIETILAMINA
AEROSOL DE ACCIÓN TÓPICA

Alivio sintomático del dolor y la inflamación localizada
Torceduras
Traumatismos
Artrosis
Lumbalgia
Dolor de espalda
Cuello y torticolis
Esguinces y luxaciones
Codo de tenista

CONTENIDO NETO
150 g. / 125 ml.

VENTA LIBRE
INDUSTRIA ARGENTINA

 **CASASCO**