



cerca sus síntomas, y no olvide informar a su médico cómo se siente, de modo que pueda recetarle la cantidad correcta de medicamento para tratar su afección. No permita que ninguna otra persona use sus medicamentos. Pregúntele a su farmacéutico cómo puede volver a surtir su receta. Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.

#### Los síntomas de sobredosis son, entre otros

- malestar estomacal
- vómitos
- dolor de estómago
- heces negras, con aspecto de alquitrán o sanguinolentas
- vómito de una sustancia sanguinolenta o con aspecto de posos de café
- somnolencia
- respiración lenta, superficial o irregular
- pérdida del conocimiento

#### Presentación

BLOKIUUM 50: envases con 15, 30 y 100 comprimidos recubiertos.  
BLOKIUUM 75: envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos.

#### ¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:  
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.  
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.  
Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT <http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.  
MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.  
Certificado N° 36.717  
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.  
Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E-2871-01 / D3197 / Acl. 05/2017

4

**CASASCO**

# BLOKIUUM® 50 y 75

## DICLOFENAC SODICO



COMPRIMIDOS  
RECUBIERTOS

INFORMACION PARA EL PACIENTE  
- CONSULTE A SU MÉDICO -

Venta Bajo Receta  
Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar este medicamento y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

#### Fórmulas

**BLOKIUUM 50**  
Cada comprimido recubierto contiene:  
Diclofenac sódico 50,0 mg. Excipientes: cellactose 80 109,0 mg; avicel PH 200 20,0 mg; Ac-Di-Sol 12,0 mg; estearato de magnesio 2,0 mg; eudragit L30 D 55 emulsión 13,0 mg; tween 80 0,3 mg; trietilcitrato 1,0 mg; talco 10,6 mg; dióxido de titanio 2,0 mg; óxido de hierro amarillo 0,6 mg; óxido de hierro rojo 0,1 mg.

**BLOKIUUM 75**  
Cada comprimido recubierto contiene:  
Diclofenac sódico 75,00 mg. Excipientes: lactosa 54,00 mg; hidroxipropilmetilcelulosa E15 62,50 mg; hidroxipropilmetilcelulosa K100 21,00 mg; povidona K-30 15,36 mg; triacetina 0,60 mg; fosfato bicálcico 59,40 mg; estearato de magnesio 6,00 mg; talco 9,92 mg; polietilenglicol 6000 1,08 mg; propilenglicol 0,50 mg; bióxido de titanio 3,44 mg; sacarina sódica 0,14 mg; óxido de hierro rojo 35,6 µg.

#### ¿Qué es BLOKIUUM y para qué se usa?

El diclofenaco, principio activo de BLOKIUUM 50 y BLOKIUUM 75 pertenece a una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroides (AINE). Actúa impidiendo que el organismo produzca una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

#### ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

El diclofenaco se usa para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez ocasionados por la osteoartritis (artritis debida al desgaste del revestimiento de las articulaciones), la artritis reumatoide (artritis debida a la inflamación del revestimiento de las articulaciones), la espondilitis anquilosante (artritis que afecta principalmente la columna vertebral), periodos menstruales dolorosos y dolores por otras causas.

#### No tome este medicamento si

- tiene hipersensibilidad al diclofenac;
- tiene una gastritis aguda o una úlcera gastroduodenal en actividad;
- tiene ataques de asma, urticaria o rinitis aguda desencadenadas por administración de aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides;
- durante el 3° trimestre del embarazo.

1



#### ¿Cómo se debe usar este medicamento?

- BLOKIUUM se presenta en forma de comprimidos de liberación inmediata (50 mg) y comprimidos de liberación prolongada (acción prolongada) (75 mg), para administración por vía oral. Por lo general, los comprimidos de liberación inmediata se toman de 2 a 3 veces al día. Los comprimidos de liberación prolongada se toman generalmente una vez o dos veces al día.
- Tome BLOKIUUM más o menos a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones de la receta y pídale a su médico o farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda.
- Tome BLOKIUUM tal como se lo indiquen. No aumente ni disminuya la dosis, ni lo tome con más frecuencia que la indicada por su médico.
- A veces se receta este medicamento para otros usos; pídale más información a su médico o a su farmacéutico.

#### ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

- Antes de tomar diclofenaco,**
- dígame a su médico y a su farmacéutico si usted es alérgico al diclofenaco, la aspirina u otros AINE como ibuprofeno o naproxeno, a cualquier otro medicamento, o a cualquiera de los excipientes (ingredientes no activos) de los comprimidos de diclofenaco.
  - informe a su médico si toma cualquiera de estos medicamentos: anticoagulantes ("diluyentes de la sangre") como warfarina; aspirina; otros AINE (como ibuprofeno y naproxeno); corticosteroides (como dexametasona, betametasona, metilprednisolona y prednisona);
  - informe también a su médico y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, complementos nutricionales y productos herbales está tomando o piensa tomar: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) como enalapril, benazepril, fosinopril, lisinopril, perindopril y ramipril, ciclosporina, digoxina, diuréticos, insulina y medicamentos orales para la diabetes, litio y metotrexato. Es posible que su médico deba cambiar la dosis de sus medicamentos o vigilarle estrechamente por si presentara efectos secundarios;
  - informe también a su médico si tiene o alguna vez ha tenido úlceras, sangrado estomacal o intestinal u otros trastornos hemorrágicos;
  - informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido asma, sobre todo si también sufre con frecuencia de congestión, secreción o pólipos nasales (inflamación del revestimiento interior de la nariz); lupus (un trastorno en el que el organismo ataca muchos de sus propios tejidos y órganos, incluyendo con frecuencia la piel, las articulaciones, la sangre y los riñones); porfiria (aumento anormal de la cantidad de ciertas sustancias naturales que produce el hígado); alguna enfermedad del hígado, del riñón o corazón; o hinchazón de manos, pies, tobillos o pantorrillas;
  - informe a su médico si está embarazada, sobre todo si está en los últimos meses de gestación, si planea quedar embarazada o si está lactando. Si queda embarazada mientras toma diclofenaco, llame a su médico;
  - si tiene programada una cirugía, incluso una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando diclofenaco.

#### ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

#### ¿Qué tengo que hacer si me olvidé de tomar una dosis?

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es

2

hora de la dosis siguiente, salte la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

#### ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

Los AINE como el diclofenaco pueden causar úlceras, sangrado o perforaciones en el estómago o el intestino. Estos problemas pueden surgir en cualquier momento durante el tratamiento, presentarse sin síntomas de advertencia e incluso causar la muerte. El riesgo puede ser mayor para quienes toman AINE por mucho tiempo, son de edad avanzada, tienen problemas de salud o beben grandes cantidades de alcohol mientras toman diclofenaco. Si tiene cualquiera de estos síntomas, deje de tomar el diclofenaco y llame a su médico: dolor estomacal, acidez estomacal, vómito de una sustancia sanguinolenta o semejante a posos de café, sangre en las heces, o heces negras y con aspecto de alquitrán. El diclofenaco puede provocar otros efectos secundarios. Avisele a su médico si cualquiera de estos síntomas es intenso grave o no desaparece:

- diarrea
- estreñimiento
- gases o hinchazón abdominal
- dolor de cabeza
- mareos
- zumbido en los oídos
- aumento de peso inexplicable
- cansancio excesivo
- falta de energía
- malestar estomacal
- pérdida de apetito
- comezón
- dolor en la parte superior derecha del abdomen
- coloración amarilla de la piel o los ojos
- síntomas parecidos a los de la influenza
- fiebre
- ampollas
- sarpullido
- urticaria
- hinchazón de ojos, cara, lengua, labios, garganta, brazos, manos, pies, tobillos o pantorrillas
- dificultad para respirar o tragar
- ronquera
- palidez
- latido del corazón acelerado
- orina turbia, pálida o sanguinolenta
- dolor de espalda
- dificultad o dolor al orinar

#### ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento?

Mantenga este producto en su envase original, perfectamente cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y en un lugar alejado del exceso de calor y humedad (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los medicamentos que estén vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico cuál es la manera adecuada de desechar los medicamentos.

#### ¿Qué otra información de importancia debería saber?

No falte a ninguna cita con su médico y con el laboratorio. El médico vigilará de

3

