

**ERNEX®****BENCIDAMINA CLORHIDRATO 3 mg.****COMPRIMIDOS
DESLEIBLES****INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MÉDICO -**

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar ERNEX (Comprimidos desleíbles) y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada comprimido desleíble contiene:
Bencidamina Clorhidrato 3 mg. Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, Manitol, Aspartamo, Hidroxietilcelulosa, Aroma balsámico, Estearato de magnesio, Povidona K-30, Azúcar.

¿Qué es ERNEX comprimidos desleíbles y para qué se usa?

ERNEX *comprimidos desleíbles* contiene bencidamina que es un antiinflamatorio de uso tópico. Se usa para el tratamiento local de procesos inflamatorios limitados a la cavidad oral y la garganta (orofaringe) como estomatitis (inflamación de la boca), gingivitis (inflamación de las encías), faringitis (inflamación de la garganta), aftas y tratamiento pre y postoperatorio de cirugía odontológica.
ERNEX *comprimidos desleíbles* está indicado en adultos y en niños mayores de 6 años.
Debe consultar a su médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

Antes de usar ERNEX comprimidos desleíbles**No use ERNEX comprimidos desleíbles si**

- Es hipersensible a la bencidamina, o cualquier otro componente de la formulación.

Tenga especial cuidado con ERNEX comprimidos desleíbles

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento

- Si usted sufre fenilcetonuria
- Si usted ha padecido o padece asma.
- Si es alérgico al ácido acetilsalicílico o a otros analgésicos o antiinflamatorios (AINE).
- Si el dolor de boca o garganta empeora o persiste más de 3 días o aparece fiebre u otros síntomas ya que en un número limitado de pacientes, las ulceraciones bucofaringeas pueden ser signo de patologías más importantes, consulte con su médico o dentista.

Toma simultánea de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. No se conocen interacciones de la bencidamina con otras drogas

¿Cómo usar ERNEX Comprimidos desleíbles?

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos y niños mayores de 6 años: 1 pastilla para chupar 3 veces al día. No tome más de 3 pastillas para chupar en 24 horas.

ERNEX Comprimidos desleíbles no se puede tomar durante más de 7 días.

Cómo tomar:

Use bucofaringeo. Deje disolver lentamente una pastilla para chupar en la boca. No tragar. No masticar.

Toma de ERNEX comprimidos desleíbles con los alimentos y bebidas

Los alimentos y las bebidas no influyen cuando se toma este medicamento.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, o está planeando quedarse embarazada consulte a su mé-

1

dico antes de tomar este medicamento. La seguridad de ERNEX comprimidos desleíbles no ha sido establecida en embarazo y lactancia por lo que su médico decidirá si puede tomarlo.

Uso en niños

En niños de 6 a 11 años este medicamento debe ser siempre administrado bajo la supervisión de un adulto. ERNEX comprimidos desleíbles no debe darse a niños menores de 6 años de edad.

Conducción y uso de máquinas

ERNEX comprimidos desleíbles no afecta su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

A tener en cuenta mientras toma ERNEX comprimidos desleíbles**Efectos indeseables (adversos)**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Poco frecuentes

- Sensibilidad de la piel a la luz del sol (que causa erupción o quemadura solar).

Raros

- Sensación de quemazón o sequedad de boca. Si esto le pasa, pruebe a beber un vaso de agua para reducir el efecto.

Muy raros

- Hinchazón repentina de la boca/garganta y membranas mucosas (angioedema).

- Dificultad para respirar (laringoespasmos).

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

- Pérdida local de la sensibilidad de la mucosa oral (hipoestesia oral).

- Reacción alérgica (hipersensibilidad)

- Reacción alérgica grave (reacciones anafilácticas), cuyos signos pueden incluir dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho y/o sensación de mareo/desmayo, picor intenso de la piel o bultos en la piel, hinchazón de la cara, los labios, la lengua y/o la garganta, y que pueden ser potencialmente fatales.

¿Cómo conservar ERNEX comprimidos desleíbles?

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30 °C.

- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 10 y 20 comprimidos desleíbles.

Si Ud. toma dosis mayores de ERNEX comprimidos desleíbles de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: agosto de 2022.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas".

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar

la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234"

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico,
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Certificado N° 32.551.
Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Boyacá 237 - C.A.B.A. - Argentina.

E-5019-01 / D5351 / Act.: 10/2022

CASASCO**2**