

AMINOACIDOS
CIANOCOBALAMINA

Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Fórmula

Cada envase contiene:

- a) *En la tapa*: glutamina 60,00 mg; L-fosfotreonina 10,00 mg; L (-) triptofano 40,00 mg; cianocobalamina 0,50 mg. Excipientes: dióxido de silicio 2,00 mg; sabor naranjas polvo 10,00 mg; azúcar 57,5 mg.
b) *En el frasco*: L-fosfoserina anhidra 40,00 mg; arginina clorhidrato 100,00 mg. Excipientes: benzoato de sodio 30,00 mg; sorbitol sol 7,57 g; hidróxido de sodio c.s.; agua purificada c.s.p 10,00 ml.

Acción Terapéutica: reconstituyente general.

Los aminoácidos que integran la fórmula de Polper® B12 participan en el metabolismo intermedio; son precursores de neurotransmisores (serotonina, ácido glutámico, GABA, acetilcolina) y de moléculas metabólicamente activas.

La vitamina B12 es co-factor indispensable en el Sistema Nervioso y Hematopoyético. Participa en la síntesis de proteínas de ácidos nucleicos, de mielina y en reacciones de transmetilación. Se ha descrito como relativamente frecuente su carencia subclínica en pacientes ancianos, así como un síndrome demencial específico por déficit de esta vitamina.

Indicaciones: astenia física y psíquica. Disminución del rendimiento intelectual y memoria. Convalecencia post-quirúrgica y post-infecciosa. Sobreactividad física y psíquica. Síndrome depresivo.

Posología

Adultos: dos frascos ampollas bebibles por día, en ayunas.

Niños: un frasco ampolla bebible por día, en ayunas.

Debido a la ausencia de efectos colaterales este tratamiento puede prolongarse el tiempo que el médico considere necesario.

Instrucciones para su empleo

- 1.- Desenroscar la tapa.
- 2.- Oprimir el botón de color hasta obtener la apertura de la separación plástica y la caída del contenido del tapón en el líquido.
- 3.- Agitar fuertemente.
- 4.- Quitar el tapón blanco y echar todo el contenido en un vaso, agregando agua en igual cantidad.
- 5.- Beberlo.



Precauciones y Advertencias: como todo medicamento, su empleo en el primer trimestre del embarazo debe realizarse una vez evaluada la adecuada relación riesgo-beneficio. Hasta el momento no se han descrito efectos perjudiciales sobre el feto o sobre el curso del embarazo.

Las medicaciones que contienen L-triptofano han provocado en algunos casos síndrome de eosinofilia-mialgia. La posible interacción entre el L-triptofano y los inhibidores de la recaptación de

1

serotonina puede producir un síndrome serotoninérgico caracterizado por la combinación de excitación y síntomas gastrointestinales incluyendo diarrea. Las combinaciones de este producto con inhibidores de la recaptación de serotonina deben realizarse con precaución.

La administración de L-triptofano puede en raros casos producir somnolencia por lo cual debe advertirse a aquellos pacientes que operen maquinarias o conduzcan automóviles.

Interacciones medicamentosas: la combinación con inhibidores de la recaptación de la serotonina podría desencadenar síndrome serotoninérgico (Ver Precauciones).

Acciones colaterales y secundarias: no se han descrito efectos adversos específicos.

Antagonismo y antidotismos: no posee.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a algunos de los excipientes de la formulación.

Presentación: envases con 10 y 30 frascos ampolla bebibles.

Forma de conservación

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15° y 30° C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Fecha de última revisión: Diciembre de 2013.

NOTA IMPORTANTE

La cantidad de polvo que queda adherida entre la base y el cortante al reconstituir el producto está prevista en la dosificación para asegurar el aporte completo de los principios activos.

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici - Farmacéutico.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Bajo licencia Sigma-Tau Roma – Italia.
Certificado N° 33.519 - Industria Argentina
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Boyacá 237 - C.A.B.A.

E-0094-08 / D0903 / Act. 06/2014