

OXIDO DE ZINC - UNDECILENATO DE ZINC
PROPIONATO DE SODIO - ACIDO SALICILICO
Venta Bajo Receta - Industria Argentina

**POLVO
USO EXTERNO**

Fórmula

Cada 100 gr contiene: OXIDO DE ZINC 20,000 gr; UNDECILENATO DE ZINC 10,000 gr; PROPIONATO DE SODIO 3,000 gr; ACIDO SALICILICO 0,600 gr. Excipientes: ácido bórico 0,750 gr; metilparabeno 0,200 gr; propilparabeno 0,020 gr; Hyflo Super Cel 65,430 gr (dióxido de silicio 59,345 gr; óxido de aluminio 2,617 gr; óxido de calcio 0,327 gr; óxido de hierro 0,981 gr; óxido de sodio 2,160 gr).

Acción Terapéutica: cicatrizante, epitelizador, antiinflamatorio, antimicrobiano, antimicótico.

Indicaciones: heridas accidentales y post-quirúrgicas. Quemaduras. Escoriaciones leves. Escaras y úlceras por decúbito. Úlceras varicosas. Dermatitis por contacto. Dermatitis del pañal. Prurito. Dermatitis. Dermatofitosis. Dermatocosis. Balanopostitis. Intertrigos en lactantes, niños y adultos.

Acción Farmacológica: FACTOR X polvo desarrolla una acción astringente que disminuye el prurito y el ardor a través de un efecto secante y refrescante. Es fungicida y actúa como antiséptico creando un medio desfavorable para el crecimiento bacteriano. Estimula la regeneración de la capa córnea y contribuye a normalizar la queratinización defectuosa.

Posología y Modo de Administración: FACTOR X polvo es un producto medicinal para uso externo exclusivamente.

En quemaduras y heridas profundas, el médico indicará la modalidad y frecuencia de uso, de acuerdo con la magnitud de la lesión.

En heridas superficiales, micosis, úlceras por decúbito y en escoriaciones leves, aplicar 2 o 3 veces por día espolvoreando la zona afectada, que deberá ser previamente higienizada y secada.

En dermatitis y eritema del pañal, espolvorear sobre la piel limpia y seca después de cada cambio de pañal, especialmente en la noche, cuando los cambios pueden ser menos frecuentes.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

Advertencias: FACTOR X polvo es para uso externo exclusivamente. Evitar el contacto del producto con los ojos. Antes de su aplicación, lavar y secar bien las zonas de la piel a tratar, así como también las zonas circundantes.

Precauciones: si la curación quedará adherida a vendajes o apósitos, estos deben retirarse cuidadosamente, humedeciéndolos con agua tibia previamente hervida, con el fin de que se desprendan fácilmente sin arrastrar tejidos.

Interacciones medicamentosas: el uso concomitante del producto con preparados tópicos que poseen en su fórmula tretinoína, resorcinol, peróxido de benzoilo y/o alcohol; pueden causar irritación localizada.

Embarazo y Lactancia: no se han descrito problemas en humanos.

Reacciones adversas: ocasionalmente puede causar sequedad en la piel.

Sobredosificación: ante la eventualidad de una sobredosificación o ingesta accidental, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777. Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Opcionalmente otros Centros de Intoxicaciones.

Presentación: envase con 50 g.
Fecha de última revisión: junio de 2017.

Forma de Conservación

- Conservar dentro de su envase original, cerrado, junto con su estuche y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico. ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. Certificado N° 58.383. Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Boyacá 237 - C.A.B.A.

1**INFORMACION PARA EL PACIENTE
-CONSULTE A SU MEDICO -**

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a aplicarse FACTOR X y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

¿Qué es FACTOR X y para qué se usa?

FACTOR X es un polvo que favorece la cicatrización, y desarrolla una acción antiinflamatoria, antimicótica y antibacteriana. Se utiliza para heridas accidentales y post-quirúrgicas. Quemaduras. Escoriaciones (raspaduras) leves de la piel. Escaras y úlceras por decúbito. Úlceras varicosas. Dermatitis por contacto. Dermatitis del pañal. Prurito. Dermatofitosis. Distintos tipos de micosis (infecciones por hongos)

Antes de usar FACTOR X

No use FACTOR X si Ud. tiene: hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

Tenga especial cuidado con FACTOR X

FACTOR X polvo es para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos. Antes de su aplicación, debe lavar y secar bien las zonas de la piel a tratar, así como también las zonas circundantes. Si la curación quedará adherida a vendajes o apósitos, estos deben retirarse cuidadosamente, humedeciéndolos con agua tibia (previamente hervida), con el fin de que se desprendan fácilmente sin arrastrar y lesionar tejidos.

Uso simultáneo con otros medicamentos

El uso concomitante del producto con preparados tópicos que poseen en su fórmula tretinoína, resorcinol, peróxido de benzoilo y/o alcohol, pueden causar irritación localizada.

Embarazo y Lactancia: no se han descrito inconvenientes con su empleo.

Uso en niños y en ancianos: no existen inconvenientes para su uso en niños o ancianos.

¿Cómo usar FACTOR X?

FACTOR X polvo es un producto medicinal para uso externo exclusivamente.

En quemaduras y heridas profundas, el médico indicará la modalidad y frecuencia de uso, de acuerdo con la magnitud de la lesión. En heridas superficiales, micosis, úlceras por decúbito y en escoriaciones leves, aplicar 2 o 3 veces por día espolvoreando la zona afectada, que deberá ser previamente higienizada y secada. En dermatitis y eritema del pañal, espolvorear sobre la piel limpia y seca después de cada cambio de pañal, especialmente en la noche, cuando los cambios pueden ser menos frecuentes.

Efectos indeseables (adversos)

Ocasionalmente puede causar sequedad en la piel.

¿Cómo conservar FACTOR X?

- Conservar dentro de su envase original, cerrado, junto con su estuche y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación: envases con 50 g.

Si Ud. toma dosis mayores de FACTOR X de las que debiera

FACTOR X es un producto de uso exclusivamente externo, sobre la zona inflamada. Si accidentalmente fuera ingerido, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777. Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Opcionalmente otros Centros de Intoxicaciones.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas”. “Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico. ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. Certificado N° 58.383. Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Boyacá 237 - C.A.B.A.

