

110 mm

9613



BRONCHO-VAXOM® Niños

LISADOS BACTERIANOS LIOFILIZADOS GRANULADO

INFORMACION PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MEDICO -

Venta Bajo Receta - Industria Suiza

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar BRONCHO-VAXOM® Niños y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada sobre contiene: liofilizado estandarizado de lisados bacterianos (OM-85)* 20,000 mg; Excipientes: almidón de maíz pregelatinizado; estearato de magnesio; silicato de magnesio; manitol.

* Composición de 20 mg de liofilizado estandarizado

Principio activo: Lisados bacterianos liofilizados de Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae y ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y viridans y Neisseria catarrhalis. Excipientes: galato de propilo; glutamato de sodio anhidro; manitol.

¿Qué es BRONCHO-VAXOM® Niños y para qué se usa?

Se utiliza como inmunostimulante para aumentar las defensas naturales.

BRONCHO-VAXOM® Niños puede prevenir o aliviar las crisis agudas de bronquitis crónica y las infecciones repetidas del sistema respiratorio particularmente, sinusitis (infección sinusal), nasofaringitis (resfrío común) y otitis (infección del oído).

Este medicamento también puede utilizarse en combinación con otros tratamientos posibles que se receten durante períodos agudos de infección respiratoria.

Antes de usar BRONCHO-VAXOM® Niños

Si su médico también le recetó otros medicamentos a su hijo, especialmente antibióticos, también debe tomarlos.

No use BRONCHO-VAXOM® Niños si

Si su hijo tiene hipersensibilidad conocida (alergia) a BRONCHO-VAXOM® Niños o a cualquiera de los componentes de este medicamento.

¿Qué cuidados debe tomar durante el uso de BRONCHO-VAXOM® Niños?

Si los síntomas persisten, comuníquese con su médico o farmacéutico que le explicarán qué medidas debe tomar y, cuando sea necesario, el farmacéutico le pedirá que consulte con su médico.

BRONCHO-VAXOM® Niños no debe administrarse en niños menores de 6 meses ya que su sistema inmunitario no está completamente desarrollado.

Informe a su médico o farmacéutico si su hijo: tiene alguna otra enfermedad, es alérgico, ya está recibiendo otros medicamentos para uso interno o externo (incluida la automedicación).

Tenga especial cuidado con BRONCHO-VAXOM® Niños

Si su hijo tiene alguna otra enfermedad o si es alérgico. Informe siempre a su médico.

Toma simultánea de otros medicamentos

No existen inconvenientes descriptos en la asociación con otros medicamentos. No obstante, informe siempre a su médico.

Embarazo y lactancia

De acuerdo con los experimentos realizados hasta la fecha, no existen riesgos conocidos para el niño si este medicamento se utiliza según lo previsto. No obstante, no se llevaron a cabo estudios científicos sistemáticos en mujeres embarazadas. Como precaución, evite, en lo posible, tomar medicamentos durante el embarazo y la lactancia, o consulte a su médico o farmacéutico.



3196

TEC.FI.COM

1

110 mm

9613



¿Cómo usar BRONCHO-VAXOM® Niños?

Siempre use este medicamento de acuerdo con la dosis que se indica en el prospecto o las indicaciones de su médico. Si considera que el efecto de este medicamento es demasiado suave o demasiado fuerte, consulte con su médico o farmacéutico.

Niños de entre 6 meses y 12 años:

Tratamiento preventivo y/o terapéutica de consolidación: un sobre diario administrado en ayunas durante 10 días consecutivos al mes durante un lapso total de 3 meses.

Tratamiento de los episodios agudos: un sobre diario administrado en ayunas hasta la desaparición de los síntomas (como mínimo 10 días). Cuando el tratamiento requiera la administración simultánea de antibióticos, se recomienda la combinación con BRONCHO-VAXOM® Niños desde el comienzo de la terapéutica.

El contenido del sobre debe ser vertido en un vaso de agua u otras bebidas (leche, jugo de frutas, etc.) para luego ingerirse.

Si se receta un antibiótico, BRONCHO-VAXOM® Niños puede combinarse desde el inicio del tratamiento.

Uso apropiado del medicamento BRONCHO-VAXOM® Niños

Si olvidó de tomar BRONCHO-VAXOM® Niños

No es necesario recuperar la toma. Continúe el tratamiento hasta completar las dosis indicadas.

A tener en cuenta mientras toma BRONCHO-VAXOM® Niños

Efectos indeseables (adversos)

La administración de BRONCHO-VAXOM® Niños puede provocar los siguientes efectos secundarios: trastornos gastrointestinales (dolor estomacal, náuseas, diarrea y vómitos), reacciones cutáneas (enrojecimiento y picazón), cefaleas, problemas respiratorios (empeoramiento de la tos, dificultad para respirar y asma) y efectos secundarios generales (temperatura de hasta 40 °C, temblores, cansancio y reacciones alérgicas). La mayoría de estos efectos secundarios son temporarios.

En el caso de que ocurran trastornos gastrointestinales o respiratorios persistentes, interrumpir el tratamiento e informar al médico.

BRONCHO-VAXOM® Niños puede provocar reacciones cutáneas infrecuentes, que pueden ser serias.

Si ocurre una reacción cutánea, interrumpir el tratamiento e informar al médico de inmediato.

Si se observa cualquier otro efecto secundario, informar al médico o al farmacéutico.

¿Cómo conservar BRONCHO-VAXOM® Niños?

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.

- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación: envases con 10 y 30 sobres.

Fecha de última revisión: julio 2017

Si ud toma dosis mayores de BRONCHO-VAXOM® Niños de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosisificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas". "Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.


ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION. Certificado N° 50.106. Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

Elaborado por OM PHARMA, Meyrin-Ginebra, Suiza.

Representante y distribuidor para ARGENTINA LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. – Boyacá 237 – C.A.B.A.

E-2870-03 / D3196 / Act. 05/2019

CASASCO



3196

TEC.FI.COM

2

150 mm

150 mm