

con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas”.
“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”

Fecha de última revisión: abril de 2021.
Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
Certificado N° 53.790
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
.

E-4523-01 / D4852 / Act.: 09/2021



4

QUAZEMIC®



CLONAZEPAM 1 mg
CLONAZEPAM 0,25 mg
CLONAZEPAM 2,5 mg/ml

COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS SUBLINGUALES
GOTAS

INFORMACION PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MÉDICO -

Venta Bajo Receta Archivada – Lista IV
Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar QUAZEMIC y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

QUAZEMIC - Comprimidos
Cada comprimido x 1 mg. contiene: CLONAZEPAM 1 mg. Excipientes: Amarillo de quinolina Laca Aluminica; Celulosa Microcristalina; Croscarmelosa Sódica; Laurilsulfato de Sodio; Lactosa; Estearato de Magnesio.


QUAZEMIC – Comprimidos sublinguales
Cada comprimido sublingual x 0,25 mg. contiene: CLONAZEPAM 0,25 mg; Excipientes: Sucralosa; Celulosa Microcristalina; Croscarmelosa Sodica; Lactosa; Estearato de Magnesio.

QUAZEMIC - Gotas
Cada ml contiene: CLONAZEPAM 2,5 mg. Excipientes: Sacarina Sódica; Ácido Cítrico Anhidro; Citrato de Sodio Dihidratado (Solución al 25%); Butilhidroxitolueno; Butilhidroxianisol; Esencia de Uva; Agua Purificada; Propilenglicol.

¿Qué es QUAZEMIC y para qué se usa?
QUAZEMIC contiene clonazepam, una sustancia con acción ansiolítica y anticonvulsivante perteneciente al grupo de las benzodiazepinas.
QUAZEMIC está indicado en:
Trastornos epilépticos:
- Ausencias (Petit mal) refractarias a succinimidas.
- Síndrome de Lennox-Gastaut (variante del Petit mal), como monoterapia o como terapia coadyuvante.
- Crisis akinéticas y mioclónicas.
- Trastorno de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia (DSM-IV).

Antes de usar QUAZEMIC
Usted debe informarle a su médico si:
- Está bajo tratamiento con sedantes (como diazepam), especialmente durante el día.
- Ha tenido un empeoramiento de una depresión preexistente, ha pensado hacerse daño o ha sufrido un cambio inusual en su humor o en su comportamiento.
- Se encuentra bajo tratamiento con opioides (como hidrocodona).
- Padece ataxia (falta de coordinación) espinal o cerebelosa.

1



- Padece o ha padecido convulsiones.
- Padece porfiria (trastorno congénito del metabolismo del grupo hemo de la hemoglobina).
- Padece de sialorrea (niveles excesivos de saliva), apnea del sueño (detención transitoria de la respiración durante el sueño) o enfermedad pulmonar crónica.
- Sufre intolerancia a la lactosa.

No use QUAZEMIC si
- Es alérgico a fármacos de la familia de las benzodiazepinas o a cualquier otro componente del producto.
- Padece de glaucoma de ángulo estrecho (enfermedad ocular causada por la elevación rápida y dolorosa de la presión dentro del ojo).
- Tiene problemas de dependencia de alcohol, fármacos o sustancia de abuso.
- Padece insuficiencia respiratoria severa.
- Presenta problemas severos en el hígado.
- Padece de miastenia gravis.

Toma simultánea de otros medicamentos
Debe informarle a su médico todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial informe si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos utilizados para:
- Ansiedad o trastornos del sueño (medicamentos conocidos como depresores del sistema nervioso central como zolpidem, eszopiclona, fenobarbital, opioides).
- Dolor severo (analgésicos derivados de la morfina como codeína).
- Trastornos convulsivos (tratamiento conjunto con otras drogas antiepilépticas como ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital).
- Depresión (como fluoxetina, sertralina).
- Gastritis (como ranitidina y propantelina).
- Medicamentos orales para infecciones provocadas por hongos (como ketoconazol).

¿Cómo usar QUAZEMIC?
Debe tomar la dosis exacta de QUAZEMIC y durante el tiempo que su médico le ha indicado. Su médico decidirá su dosis inicial. La dosis de mantenimiento (dosis diaria) dependerá de su enfermedad y de sus necesidades. La dosis podrá variar en función de su peso, edad y enfermedad:
Trastornos epilépticos: entre 1-20 mg/día.
Trastornos de angustia: entre 0,5-4 mg/día.

Embarazo y lactancia
Antes de comenzar a tomar QUAZEMIC, debe informarle si está embarazada, presume estarlo o si planea quedar embarazada. Debe informarle a su médico si está amamantando.

Uso en niños
QUAZEMIC no debe administrarse como ansiolítico en menores de 18 años.

Uso en ancianos
Es probable que su medico le indique una dosis inferior.

Uso en personas con problemas de riñón o hígado
Posiblemente su medico le indique una dosis menor.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos
QUAZEMIC puede enlentecer sus pensamientos y habilidades motoras. Evite realizar estas actividades durante el tratamiento con QUAZEMIC.

2

Toma conjunta de QUAZEMIC con alimentos y bebidas
Se aconseja no tomar alcohol.

Uso apropiado del medicamento QUAZEMIC
QUAZEMIC comprimidos birranurados: ingerir con agua y sin masticar.
QUAZEMIC comprimidos sublinguales:
- Colocar el comprimido de QUAZEMIC debajo de la lengua.
- Mantenerlo durante por lo menos 3 (tres) minutos.
- Evitar tragar el comprimido antes de transcurrido dicho tiempo.
QUAZEMIC Gotas: mantenga el frasco cuentagotas en posición vertical con la boca hacia abajo. En caso de que la solución no salga, agite el frasco ligeramente o inviertalo varias veces consecutivas.
Las gotas deben diluirse en agua, té o jugos de fruta en una cuchara y se tomara de la misma. No dosificar directamente de la boca.
1 ml de solución oral = 25 gotas = 2,5 mg de clonazepam

Si se olvidó de tomar QUAZEMIC
Si usted olvidó tomar una dosis nunca debe tomar una dosis doble cuando le toque la siguiente toma. En vez de ello simplemente continúe con la dosis habitual en la próxima administración del medicamento.

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura. En general la dosis debe reducirse gradualmente para evitar efectos no deseados (efectos de retirada).
En algunos casos puede ser necesario implementar una terapia de sustitución con otro anticonvulsivante.
No se debe interrumpir el tratamiento con QUAZEMIC repentinamente sin consultar a su médico.

Efectos indeseables (adversos)
Como todos los medicamentos QUAZEMIC puede causar efectos indeseables en algunos pacientes. Los efectos indeseables que se han observado con mayor frecuencia con clonazepam incluyen: somnolencia, problemas para caminar o de coordinación de los movimientos, depresión, trastornos de comportamiento, alteraciones de la memoria, nerviosismo, mareos, visión borrosa.
Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no mencionado aquí, consulte a su médico.

¿Cómo conservar QUAZEMIC?
- Conservar en lugar seco, preferentemente entre 15-30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación
Comprimidos: envases con 30 y 60 comprimidos.
Comprimidos sublinguales: envases con 30 comprimidos.
Gotas: envase con 20 ml.



Esta especialidad medicinal está libre de gluten.

Si Ud. toma dosis mayores de QUAZEMIC de las que debiera
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse

3

