



## MILCANOR®



DIOSMINA 450 mg  
HESPERIDINA 50 mg  
(FLAVONOIDES MICRONIZADOS)

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

## MILCANOR®



DIOSMINA 900 mg  
HESPERIDINA 100 mg  
(FLAVONOIDES MICRONIZADOS)

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Venta Bajo Receta - Industria Argentina

### FÓRMULAS

Cada comprimido recubierto x 500 mg contiene: Diosmina 450,000 mg; Hesperidina 50,000 mg; Excipientes: Hidroxipropilcelulosa 8,000 mg; Almidón Glicolato Sódico 22,000 mg; Crospovidona 50,000 mg; Estearato de Magnesio 6,000 mg; Celulosa Microcristalina c.s.p. 700,000 mg; Cubierta: Hidroxipropilmetilcelulosa E15 4,320 mg; Polietilenglicol 6000 2,160 mg; Dióxido de Titanio 5,825 mg; Talco 3,600 mg; Povidona K30 1,603 mg; Óxido de Hierro Amarillo (CI 77492) 1,030 mg; Óxido de Hierro Rojo (CI 77491) 0,462 mg.

Cada comprimido recubierto x 1000 mg contiene: Diosmina 900,000 mg; Hesperidina 100,000 mg; Excipientes: Hidroxipropilcelulosa 16,000 mg; Almidón Glicolato Sódico 44,000 mg; Crospovidona 100,000 mg; Estearato de Magnesio 12,000 mg; Celulosa Microcristalina c.s.p. 1400,000 mg; Cubierta: Hidroxipropilmetilcelulosa E15 8,640 mg; Polietilenglicol 6000 4,320 mg; Dióxido de Titanio 11,650 mg; Talco 7,200 mg; Povidona K30 1,206 mg; Óxido de Hierro Amarillo (CI 77492) 2,060 mg; Óxido de Hierro Rojo (CI 77491) 0,924 mg.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vasculoprotector. Flebotónico. Antihemorroidal.  
Cód. ATC: C05CA53

### INDICACIONES

Trastornos de la circulación venosa (piernas pesadas, dolores, impaciencia de primus decubitus). Venotónico, flebotónico (aumenta la tonicidad de las venas), y vasculoprotector (aumenta la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos). Crisis hemorroidal. Para el tratamiento de las manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores, funcional y orgánica; sensación de pesadez, dolor, calambres nocturnos. A nivel de las venas, disminuye la distensibilidad venosa y reduce la estasis venosa. A nivel de la microcirculación, normaliza la permeabilidad capilar refuerza la resistencia capilar.

### ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Diosmina – Hesperidina (Flavonoides Micronizados) es un venotónico y un vaso protector (produce una vasoconstricción, un aumento de la resistencia de los vasos y una disminución de su permeabilidad).

La asociación farmacológica de Diosmina - Hesperidina (Flavonoides Micronizados) ejerce una triple acción sobre el sistema venoso de retorno; a nivel de las venas y de las vénulas aumenta la tonicidad parietal y ejerce una acción antiestasis venosa; a nivel linfático estimula el drenaje linfático y mejora la actividad linfagoga; a nivel de la microcirculación aumenta la resistencia capilar y normaliza la permeabilidad capilar.

Estas actividades farmacológicas han sido demostradas en estudios doble ciego que han objetivado y cuantificado su actividad sobre la hemodinamia venosa.

La actividad venotónica ha sido establecida por la plestismografía que evidenció una disminución del tiempo de vaciamiento venoso.

La actividad sobre la microcirculación se ha demostrado en estudios doble ciego que han resultado estadísticamente significativos comparados contra placebo.

En pacientes con fragilidad capilar, el aumento de la resistencia capilar post-tratamiento se demostró por la angioestereometría.

E-4994-01 | D5326 | Act.: 07/2022

CASASCO

4

1

### FARMACOCINÉTICA

La absorción es rápida a nivel gastrointestinal, ya que el inicio de su acción está dentro de la primera hora y se mantiene por 24 horas. La vida media de eliminación es de 11 horas, la excreción es esencialmente fecal (80%) y la eliminación urinaria representa el 14% de la dosis administrada.

La asociación diosmina – hesperidina (Flavonoides Micronizados) es ampliamente metabolizada, como se demuestra por la eliminación de fenoles y de ácido hipúrico por la vía urinaria.

### POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

#### Insuficiencia venosa

Dos comprimidos recubiertos de 500 mg por día, 1 por la mañana y 1 por la noche o 2 comprimidos por la mañana con el desayuno; o un comprimido recubierto de 1000 mg preferentemente por la mañana.

#### Mantenimiento de la enfermedad hemorroidal

Dos comprimidos recubiertos de 500 mg por día o 1 comprimido recubierto de 1000 mg.

#### Crisis hemorroidales

Seis comprimidos recubiertos diarios durante los primeros 4 días, luego 4 comprimidos recubiertos diarios los 3 días siguientes. Tres comprimidos recubiertos de 1000 mg los primeros 4 días y luego 2 comprimidos recubiertos durante 3 días.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. Primer trimestre del embarazo.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Crisis hemorroidal:** si los trastornos hemorroidales no desaparecen en 15 días, es indispensable consultar a su médico. La administración de este producto no excluye el tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento debe ser de corta duración. Si los síntomas no disminuyen rápidamente, debe practicarse un examen proctológico y el tratamiento debe ser revisado.

**Trastornos de la circulación venosa:** este medicamento demuestra toda su eficacia cuando va acompañado por una buena higiene. Evitar la exposición al sol, el calor, la posición de pie prolongada y el exceso de peso. La marcha y eventualmente el uso de medias adaptadas favorecen la circulación sanguínea.

#### Interacciones medicamentosas

No debe administrarse simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos ya que puede disminuir su absorción.

Puede administrarse simultáneamente con cualquier otro medicamento.

#### Embarazo

No se han demostrado en estudios en animales efectos teratogénicos. En humanos no se ha demostrado ningún efecto nocivo hasta el momento.

#### Lactancia

Si bien no hay datos actuales no debe administrarse el medicamento durante la lactancia.

#### Uso en Pediatría

MILCANOR no está dirigido al uso en niños y adolescentes (menores de 18 años).

#### Efecto sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad de conducción y uso de máquina con MILCANOR.

### REACCIONES ADVERSAS

Los efectos adversos incluyen:

#### Frecuentes:

- Trastornos gastrointestinales leves: diarrea, dispepsia, náuseas, y vómitos.

#### Raros:

- Trastornos neurovegetativos: dolor de cabeza, malestar y vértigo.
- Trastornos cutáneos: erupción, prurito y urticaria.

2



### SOBREDOSIFICACIÓN

Hasta la fecha no existe reporte de accidentes por sobredosis, en el caso de que esto sucediera deberá instituirse el tratamiento sintomático específico y vigilar los signos vitales.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

Este especialidad medicinal está libre de gluten.



### PRESENTACIÓN

MILCANOR 500 mg: envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

MILCANOR 1000 mg: envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: febrero de 2020.

### FORMA DE CONSERVACIÓN

- Conservar en lugar seco, entre 15 y 30°C.

- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Certificado N° 59.178

Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

3