



FORMA DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15° C y 30° C.

Presentaciones: envases con 10 y 20 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: Octubre de 2024

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.
Certificado N° 36.717
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

BLOKIU^M₂₅

DICLOFENAC SÓDICO 25 MG

Venta Libre · Industria Argentina Comprimidos recubiertos

BLOKIU^M₂₅

DICLOFENAC SÓDICO 25 MG



E-7286-01 / D7625 / Act.: 11/2024

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE BLOKIU 25?

Cada comprimido recubierto contiene: Ingrediente activo: Diclofenac sódico 25 miligramos. Ingredientes inactivos: cellactose 80, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, talco, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, povidona, bióxido de titanio, sacarina sódica, polietilenglicol 6000, propilenglicol.

ACCIONES

Analgésico. Antiinflamatorio.

¿PARA QUE SE USA BLOKIU 25?

BLOKIU 25 es un medicamento que se utiliza para el alivio de dolores musculares y de articulaciones, especialmente los que se acompañan de inflamación. También está indicado en dolores de espalda, dolor de cabeza, dolores dentales y dolor menstrual.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR BLOKIU 25?

NO utilizar **BLOKIU 25** en caso de: alergia conocida a alguno de los componentes del producto, a la aspirina u otros antiinflamatorios; úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias; hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante; insuficiencia hepática o renal; enfermedades serias de la sangre; uso de diuréticos; embarazo o lactancia.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de utilizar **BLOKIU 25** conjuntamente con otros medicamentos es conveniente consultar al médico.

- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica.
- Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo.

Si usted tiene dudas con respecto a estas instrucciones consulte con su médico.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. **BLOKIU 25** no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que aparece en el dorso del envase.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea o dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel. Síntomas de hipersensibilidad: picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas o manos, dificultad para respirar. Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece cualquier síntoma que le impresione relacionado al uso del producto, que le ocasione preocupación o que le parezca poco usual. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Este

medicamento está contraindicado en embarazo y lactancia.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

- Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido recubierto de **BLOKIU 25** tres veces al día (cada 8 horas).
 - Dolor menstrual: 1 comprimido recubierto de **BLOKIU 25** 1 ó 2 veces por día.
 - Dosis máxima: 3 comprimidos recubiertos de **BLOKIU 25** al día. No superar la dosis máxima recomendada ni acortar los intervalos entre las dosis salvo por orden médica.
- Mayores de 65 años o menores de 15 años: consulte con su médico. Transcurridos 3 días de uso sin mejoría o con empeoramiento de los síntomas, se recomienda consultar al médico. No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico. Ingerir los comprimidos recubiertos de **BLOKIU 25** con suficiente líquido. La presencia de alimentos en el estómago en el momento de la ingestión suele mejorar la tolerabilidad, sin afectar su efecto terapéutico en forma significativa.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un centro de toxicología, en especial: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694 Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160 Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese al siguiente teléfono: ANMAT Responde: 0800 333 1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

