



LOPERAPID®



Loperamida clorhidrato 2 mg

COMPRIMIDOS

Vía de Administración: Oral

Venta Libre - Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE LOPERAPID?

Cada comprimido contiene:

Ingrediente activo: Loperamida clorhidrato 2,000 miligramos. Ingredientes inactivos: celulosa microcristalina; dióxido de silicio coloidal; croscarmelosa sódica; estearato de magnesio.

ACCIÓN

Antidiarreico. Disminuye la motilidad intestinal (movimientos del intestino que impulsan la materia fecal).

¿PARA QUÉ SE USA LOPERAPID?

LOPERAPID está indicado para el alivio sintomático de la diarrea aguda de inicio reciente de causa no infecciosa. La loperamida no trata la causa de la diarrea.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LOPERAPID?

NO USE este medicamento si:

- Sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
- Tiene diarrea con fiebre, escalofríos, sudoración o vómitos.
- Pierde sangre, moco o pus con la materia fecal.
- Tiene colitis ulcerosa.
- Tiene problemas graves de hígado.
- La diarrea se debe a infección por microorganismos invasores, como *Salmonella*, *Shigella* y *Campylobacter*.
- Toma analgésicos narcóticos.
- Toma antibióticos al mismo tiempo, consulte a su médico.

No administrar a menores de 12 años y adultos mayores de 65 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted tiene insuficiencia hepática, está tomando algún medicamento o está embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de tomarlo.

Los niños presentan mayor sensibilidad a los efectos adversos sobre el sistema nervioso central y una gran variabilidad de respuestas a la loperamida. Además, el uso de loperamida en niños puede ocultar síntomas de deshidratación.

No tome LOPERAPID para otra cosa que no sea su uso previsto. Nunca utilice más de la cantidad recomendada. Se han reportado problemas cardíacos graves (cuyos síntomas incluyen latidos cardíacos rápidos o irregulares) en pacientes que tomaron demasiada loperamida.

Si Ud. recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como dolor epigástrico (a nivel de la boca del estómago), sequedad de boca, náuseas, vómitos, calambres abdominales y anorexia.

Sólo con el uso de dosis muy elevadas puede ocasionalmente producir distensión y dolor abdominal, constipación o mareos. Puede provocar somnolencia, por lo que es necesario tomar precauciones en personas que operan máquinas que requieren atención.

Si usted toma antibióticos al mismo tiempo, puede suceder que empeore la diarrea producida por los antibióticos. No usar simultáneamente con analgésicos narcóticos debido a que puede producirse una constipación severa.

1



Solo debe utilizar LOPERAPID de acuerdo a lo que está recomendado en el prospecto. No use más de la dosis máxima recomendada (8 mg al día), ya que podría causar problemas graves en el ritmo cardíaco.

"SI LA DIARREA PERSISTE POR MÁS DE 2 DÍAS O EMPEORA, CONSULTE A SU MÉDICO".

¿CÓMO SE USA LOPERAPID?

Los comprimidos de LOPERAPID se administran con líquido por vía oral. Es conveniente además ingerir abundantes líquidos, a fin de evitar la deshidratación.

Adultos y niños mayores de 12 años:

- Diarrea aguda: dosis inicial de 2 comprimidos juntos (4 mg de loperamida) por vía oral, seguidos de 1 comprimido (2 mg de loperamida) luego de cada deposición diarréica.

No tome este medicamento durante más de 2 días consecutivos. Si los síntomas empeoran o persisten por más de 48 horas, consulte a su médico.

La dosis máxima es de 8 mg (4 comprimidos) por día.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Si ha tomado más LOPERAPID de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico, farmacéutico o llame a un centro de intoxicaciones indicando el medicamento y la cantidad tomada. Podría ser necesario acudir a un hospital.

Los síntomas que usted podría observar podrían incluir: cambios en el ritmo cardíaco (ritmo irregular o aumentado); estos síntomas pueden tener consecuencias graves o mortales. Rigididad muscular, movimientos descoordinados, somnolencia, dificultad para orinar o respiración débil. Los niños, en comparación con adultos, presentan mayor sensibilidad a grandes cantidades de LOPERAPID. Si un niño utiliza demasiado o muestra alguno de los síntomas anteriores, llame a su médico de inmediato.

Ante la eventualidad de una sobredosisificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese al siguiente teléfono:

ANMAT Responde: 0800 - 333 - 1234

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

FORMA DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco, entre 15°C y 25°C.

Presentaciones:

Envases con 10 comprimidos.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Julio 2025

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Certificado N° 60.439

Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

E-7917-01/ D8260 / Act. 05/2025

CASASCO

2